

โรคพิษสุนัขบ้า

ไม่ได้เป็นแค่กับหมา ไม่ได้มาแค่หาไวรอน แต่เป็นแล้วตายแน่นอน



จากรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จากกรมปศุสัตว์ ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดง คือ จังหวัดสุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ จะเรึงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ ที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 คน นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้ สุรินทร์พื้นที่สีเหลือง ซึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า คือ เจ้าของไม่นำสัตว์เลี้ยง ไปฉีดวัคซีนป้องกัน ปล่อย สัตว์เลี้ยงไปนอกบ้านเสี่ยงถูกกัดจากสัตว์ที่มีเชื้อ ที่สำคัญขาดความตระหนักถึงการป้องกัน การฉีดเชื้อ ขณะนี้จังหวัดที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ จัดงานการทำานของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปดำเนินการควบคุมหมาแมว (นายสัตวแพทย์จรศักดิ์ ศิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรม ปศุสัตว์)

ทางด้านการจัดจังหวัดชลบุรี เป็นเขตป่า ร่วมอากาศที่ร้อนจัด โรคที่มากับช่วงหน้าร้อนนี้มีด้วยกันหลายโรคที่ต้องเฝ้าระวัง อีกโรคที่ไม่ควรมองข้ามเลย คือ โรคพิษสุนัขบ้า โรคนี้เป็นแล้วจะเสียชีวิตทุกราย ยังไม่มียารักษา สัตว์นำโรคที่พบบ่อยที่สุดคือสุนัข รองลงมาคือแมว นอกจากนี้อาจพบในสัตว์ที่เล็กๆ ซอมเอื้องคือ กระรอก กระแต หรือสัตว์ป่า เช่น ลิง ชะนี หากบ้านใครเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสุนัขและแมว ควรนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอย่างสม่ำเสมอจะดีกว่า



ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกทรงครองครองชอนอกนอกบ้านให้ระมัดระวังไม่ให้เจ้าโกอีฮักวี่ที่เป็นตัวนำโรค โดยเฉพาะฮักวี่ที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน ไม่แก๊งฮักวี่ให้ฮักวี่โกรธ ระมัดระวังไม่ให้ฮักวี่ข่วนหรือเคี้ยว หากออกนอกสุนัข แบนว หรือฮักวี่เลี้ยงลูกด้วยนมกีด ให้รีบฉีดยาป้องกันและน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง เจริญให้ทั้งน้ำหวานด้วยสารอะลาโอไอโอติน เช่น โทวีโคโนไอโอติน หรือยารักษาแผลสดอื่นๆ คิดความเจ้าของฮักวี่ที่อาจพบประวัติการฉีดวัคซีนของฮักวี่ แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เพราะหากคิดเจ็บบ่อยไม่ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบก็เสี่ยงเสียชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ การรับวัคซีนต้องรับต่อเนื่องหลายเข็ม ที่สำคัญคือ ใน 7 วันแรกต้องฉีดให้ได้ครบ 3 เข็ม หลังจากนั้นที่ 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน อีก 2 เข็ม จะฉีดหรือไม่ขึ้นอยู่กับอาการของฮักวี่ที่ต้องกักขังไว้สังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากฮักวี่มีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที

นอกจากนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเป็นศูนย์กลางในการให้บริการตามกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนฮักวี่ การคำคักทำหมันและฉีดยาคุมกำเนิด การรับเลี้ยงสุนัขที่ประชาชนมีความจำเป็น โดยไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้ (ป้องกันการนำฮักวี่ไปปล่อยตามสาธารณะ) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและฮักวี่

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลให้บริการหรือนัดหมายขอรับบริการได้ที่ท้องถิ่นใกล้บ้านท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์เขตทั่วประเทศ

โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้




1

๑.อย่าแหยม สุนัขให้โมโห

2

๒.อย่าแหยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

3



๓.อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ

4



๔.อย่าหยิบ จานข้าวหรือย้ายอาหาร

5



๕.อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ

ที่มาของข้อมูล : https://www.khaosod.com/special-stories/news_794840, คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
<http://www.thailandchontun.com/index.php?lay=show&ac=article&id=538799161&Ntype=2>

ถ่ายภาพและเรียบเรียงโดย : นางสาวศรัทธาธรรม สมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานสุขภาพ โรงเรียนอาชีวศึกษา
 พิมพ์โดย : กัญญาธิวัตร์ โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่งานธุรการ กลุ่มงานสุขภาพ โรงเรียนอาชีวศึกษา

